

Rappel sur les Accidents d'Exposition au Sang (AES)

De nombreuses interventions se déroulent dans un environnement traumatique hémorragique, à tout moment le sapeur-pompier peut être exposé au risque d'accident lié au sang soit par projection sur la peau, soit par pénétration percutanée.

1 ►► Protection

La première protection contre les accidents lié au sang : **le port de gant**.

Il faut être vigilant par rapport aux déchets de soins (compresses, CHUT ...), ils doivent être manipulés avec des gants et jetés immédiatement après utilisation dans les sacs poubelles jaunes prévus à cet effet. Les aiguilles, les objets coupants doivent être manipulés avec prudence, et jetés dans les boîtes à aiguilles. Ne jamais essayer de les reboucher.

2 ►► Premiers soins immédiats

Piqûre et blessure	Projection sur les muqueuses ou dans les yeux	Contact direct du liquide biologique sur peau lésée
<ul style="list-style-type: none">►► Nettoyer la zone cutanée à l'eau et au savon, sans faire saigner►► Rincer soigneusement►► Désinfecter au moins 5 minutes avec du Dakin® ou à défaut de la Bétadine®.	<ul style="list-style-type: none">►► Rincer abondamment à l'eau ou mieux au sérum physiologique de façon prolongée (15 minutes)	<ul style="list-style-type: none">►► Nettoyer la zone "atteinte" à l'eau et au savon.►► Rincer soigneusement►► Désinfecter au moins 5 minutes avec du Dakin® ou à défaut de la Bétadine®.

Il existe des kits d'AES prêts à l'emploi, à commander à la pharmacie du SSSM.

3 ►► Conseil médical dans l'heure qui suit l'AES

Il faut se rendre rapidement (maximum dans les 4 h) au service des urgences de l'hôpital pour :

- ◆ effectuer la première prise de sang
- ◆ déclarer l'accident du travail
- ◆ commencer un éventuel traitement préventif anti VIH

4 ►► Procédure d'information

Prévenir le **médecin régulateur et l'officier de garde CODIS** ainsi que le SSSM aux heures ouvrables ou par fax.